



Demencia Frontotemporal

¿Qué es la demencia Frontotemporal (FTD)?

La demencia Frontotemporal es un grupo de trastornos que afectan regiones del cerebro asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Los trastornos ocurren cuando se acumulan proteínas anormales en los lóbulos frontal y temporal del cerebro, causando su deterioro y enconamiento.

Los tipos más frecuentes de FTD son la variante frontal y la afasia progresiva primaria.

La variante frontal afecta el comportamiento y la personalidad.

La afasia progresiva primaria implica dificultades con la comunicación y tiene dos subtipos:

- Afasia progresiva no fluida que afecta la capacidad para hablar
- Demencia semántica que afecta la capacidad de entender y de usar el lenguaje

¿Cuáles son los signos y síntomas de la FTD?

La FTD tiende a ocurrir a edades más tempranas que el Alzheimer, con frecuencia entre los 40-65 años de edad. Los signos y síntomas de la FTD varían en función de la parte del cerebro afectada.

Los síntomas más comunes de la FTD son grandes cambios en la personalidad y el comportamiento, incluyendo una falta de criterio, apatía, comportamiento social inapropiado cada vez con más frecuencia, falta de empatía, pérdida de la inhibición, mala higiene personal, cambios en los hábitos de comida y comportamiento repetitivo compulsivo.

Algunos tipos de la FTD causan problemas con el lenguaje o un deterioro del habla, incluyendo una dificultad cada vez mayor para entender lenguaje tanto oral como escrito, habla titubeante y problemas formando frases.

Además, las personas con FTD informan con frecuencia de debilidad muscular o de movimientos más lentos.

¿Cuáles son los factores de riesgo de la FTD?

En algunos casos, la enfermedad es genética, y se pasa a través de la familia, pero en la mayoría de casos aún no se ha determinado una causa específica.